

SEMANA 4: DERIVADAS PARCIALES

Derivadas Parciales

Revista de Matemática/Libros

W. Mora. "Cálculo en Varias Variables."



Las aplicaciones interactivas requieren haber instalado la aplicación gratuita Wolfram CDFPlayer
<https://www.wolfram.com/cdf-player/>

Wolfram CDF Player



Contenido


4.8 Derivada Direccional (I)	1
4.9 Derivadas parciales.	2
4.10 Ejercicios	7
4.11 Solución de los ejercicios	7
Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0	9

4.8 Derivada Direccional (I)

La derivada de una función de una variable mide la tasa (instantánea) de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente. La derivada de la función $y = f(x)$ en x es,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

siempre y cuando este límite exista. Geométricamente, la derivada de f en x es la pendiente de la recta tangente a f en el punto $(x, f(x))$.



Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la derivada de f en $x_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, en la dirección de un vector unitario $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$, mide la tasa (instantánea) de cambio de f a través de la recta $L(h) = x + h\mathbf{v}$ cuando $h = 0$. El cambio en x , en la recta L , es $\|x_0 - x_0 - h\mathbf{v}\| = \|h\mathbf{v}\| = h$ (pues \mathbf{v} es unitario). De nuevo, esta derivada en la dirección de \mathbf{v} se obtiene como un límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h\mathbf{v}) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hv_1, y_0 + hv_2) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Observe que este límite es un límite de una función de una variable h , es decir, este límite es el tipo de límites que calculamos en cálculo en una variable.

Sea S la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ y $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0)) \in S$. Sea C la curva de intersección de la superficie S con el plano generado por la recta L (tal y como se muestra en la figura 4.1). Geométricamente, la derivada (direccional) de f en P (en la dirección de \mathbf{v}) es la pendiente de la recta tangente a la curva C en P .




Figura 4.1: Derivada direccional en x la dirección de v

De particular interés son la derivada en la dirección del eje X , denotada $\frac{\partial f}{\partial x}$, y la derivada en la dirección del eje Y , denotada $\frac{\partial f}{\partial y}$; llamadas *derivadas parciales* respecto a x e y respectivamente.




Figura 4.2: Derivada parcial en x en la dirección de $v = (1, 0)$
Figura 4.3: Derivada parcial en x en la dirección de $v = (0, 1)$

4.9 Derivadas parciales.

Definición 4.1 (Derivadas parciales).

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces la *derivada parcial* $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ de f respecto a la variable x_i en el punto $x = (x_1, \dots, x_n)$, se define como

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_i) - f(x)}{h}$$

siempre y cuando este límite exista. Aquí $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ con un 1 en la i -ésima posición. El dominio de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ es el subconjunto de \mathbb{R}^n en el que este límite existe.

Caso de dos variables

Cuando $z = f(x, y)$, es común denotar las derivadas parciales con $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial x}$, z_x o f_x . Según la definición,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \quad y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Es decir, para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$ derivamos de manera ordinaria f respecto a x pensando en y como una constante y para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}$ derivamos de manera ordinaria f respecto a y pensando en x como una constante. Esto es válido siempre y cuando apliquen los teoremas de derivadas en una variable.

En tres o más variables, la situación es similar: Derivamos respecto a la variable de turno, pensando en las otras variables como "constantes".

Notación. Se usan distintas notaciones para las derivadas parciales. Por ejemplo, para hablar de la derivada parcial de f respecto a x , se usan la notaciones $\frac{df}{dx}$, f_x , $\partial_x f$, etc.

La notación para evaluar una derivada parcial en un punto también puede tener variaciones. Por ejemplo, para evaluar una derivada parcial de f (respecto a x) en P se usa $f_x(P)$ o también $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_P$

Ejemplo 4.1

Recordemos que en una variable, si k es una constante,
$$\begin{cases} \frac{d}{du} (k \cdot f(u)) = k \cdot \frac{df}{du} \\ \frac{d}{du} \left(\frac{k}{f(u)} \right) = \frac{-k \cdot f'(u)}{f^2(u)} \end{cases}$$

a.) Si $z = x^2y^2 + y$, calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución:

$$\bullet z = x^2y^2 + y \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{d}{dx} (x^2)y^2 + \frac{d}{dx} (y) = 2xy^2 + 0$$

$$\bullet z = x^2y^2 + y \implies \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \frac{d}{dy} (y^2) + \frac{d}{dy} (y) = x^2 \cdot 2y + 1$$

b.) Si $z = \frac{x^3}{y^5}$, calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución:

$$\bullet z = \frac{x^3}{y^5} \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{y^5} \cdot x^3 \right) = \frac{1}{y^5} \cdot \frac{d}{dx} (x^3) = \frac{1}{y^5} \cdot 3x^2$$

$$\bullet z = \frac{x^3}{y^5} \implies \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^3}{y^5} \right) = \frac{-x^3 \cdot \frac{d}{dy} (y^5)}{y^{10}} = \frac{-x^3 \cdot 5y^4}{y^{10}}$$

Ejemplo 4.2

Recordemos que,

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} (f(u)) &= \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}, \text{ en particular } \frac{d}{dx} (f^n(u)) = n f^{n-1}(u) \cdot \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} (f(x)g(x)) &= \frac{df}{dx} \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{dg}{dx} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) &= \frac{\frac{df}{dx} \cdot g(x) - f(x) \cdot \frac{dg}{dx}}{g^2(x)} \end{cases}$$

Si $w = \frac{y + z^2 \cos^4(zx^3)}{1 + y^2}$, calcule $\frac{\partial w}{\partial x}$, $\frac{\partial w}{\partial y}$ y $\frac{\partial w}{\partial z}$

Solución:

- $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{1 + y^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (y + z^2 \cos^4(zx^3)) = \frac{0 + 4z^2 \cos^3(zx^3) \cdot -\sin(zx^3) \cdot 3x^2 z}{1 + y^2}$
- $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\frac{\partial}{\partial y} (y + z^2 \cos^4(zx^3)) \cdot (1 + y^2) - \frac{\partial}{\partial y} (1 + y^2) \cdot (y + z^2 \cos^4(zx^3))}{(1 + y^2)^2}$
 $= \frac{1 \cdot (1 + y^2) - 2y \cdot (y + z^2 \cos^4(zx^3))}{(1 + y^2)^2}$
- $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{1 + y^2} \cdot \frac{\partial}{\partial z} (y + z^2 \cos^4(zx^3))$
 $= \frac{0 + \frac{\partial}{\partial z} (z^2) \cdot \cos^4(zx^3) + z^2 \cdot \frac{\partial}{\partial z} (\cos^4(zx^3))}{1 + y^2}$
 $= \frac{2z \cdot \cos^4(zx^3) + z^2 \cdot 4\cos^3(zx^3) \cdot -\sin(zx^3) \cdot 1 \cdot x^3}{1 + y^2}$

Ejemplo 4.3 (Evaluando derivadas)

El volumen de un cono es $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$, calcule $\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r=2, h=4}$ y $\left. \frac{\partial V}{\partial h} \right|_{r=2, h=4}$

Solución:

- $\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r=2, h=4} = \left. \frac{2\pi rh}{3} \right|_{r=2, h=4} = \frac{16\pi}{3}$
- $\left. \frac{\partial V}{\partial h} \right|_{r=2, h=4} = \left. \frac{\pi r^2}{3} \right|_{r=2, h=4} = \frac{4\pi}{3}$

Ejemplo 4.4

Verifique que si $z = \arctan(y/x)$, entonces $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

Solución:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+(y/x)^2} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+(y/x)^2} \cdot \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2} \end{cases}$$

$$\therefore x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{-y}{x^2+y^2} + y \frac{x}{x^2+y^2} = 0$$

Ejemplo 4.5

Si $w = z^2 \ln(x^2) \cos(y^2)$, determine $g(z)$ tal que $x \ln(x^2) \frac{\partial w}{\partial x} + g(z) \frac{\partial w}{\partial z} = 4w$

Solución:

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial x} = z^2 \cos(y^2) \cdot \frac{d}{dx} (\ln(x^2)) = z^2 \cos(y^2) \cdot \frac{2}{x} \\ \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{d}{dz} (z^2) \ln(x^2) \cos(y^2) = 2z \ln(x^2) \cos(y^2) \end{cases}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} x \ln(x^2) \frac{\partial w}{\partial x} + g(z) \frac{\partial w}{\partial z} &= x \ln(x^2) z^2 \cos(y^2) \cdot \frac{2}{x} + g(z) \cdot 2z \ln(x^2) \cos(y^2) \\ &= 2z^2 \ln(x^2) \cos(y^2) + g(z) \cdot 2z \ln(x^2) \cos(y^2) \end{aligned}$$

Por lo tanto, si $g(z) = z$ tendríamos lo que se pide:

$$x \ln(x^2) \frac{\partial w}{\partial x} + g(z) \frac{\partial w}{\partial z} = 2z^2 \ln(x^2) \cos(y^2) + z \cdot 2z \ln(x^2) \cos(y^2) = 4z^2 \ln(x^2) \cos(y^2) = 4w \checkmark$$

Ejemplo 4.6

Si $f(t, \theta) = e^{2\theta} \phi(t, \theta)$, calcule $\frac{\partial f}{\partial t}$ y $\frac{\partial f}{\partial \theta}$

Solución: En este caso, como ϕ no es conocida, sus derivadas parciales solo se dejan indicadas.

- $\frac{\partial f}{\partial t} = e^{2\theta} \frac{\partial \phi}{\partial t}$
- $\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} (e^{2\theta}) \cdot \phi(t, \theta) + e^{2\theta} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = 2e^{2\theta} \cdot \phi(t, \theta) + e^{2\theta} \frac{\partial \phi}{\partial \theta}$

Ejemplo 4.7

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables y $u = x^5 + y^3$. Si $z = x^2g(u) + f^4(u)$, calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución: Como f y g no son conocidas, sus derivadas solo se dejan indicadas.

- $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \cdot g(u) + x^2 \frac{dg}{du} \cdot \frac{du}{dx} + 4f^3(u) \cdot \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$
 $= 2x \cdot g(u) + x^2 \frac{dg}{du} \cdot 5x^4 + 4f^3(u) \cdot \frac{df}{du} \cdot 5x^4$
- $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \frac{dg}{du} \cdot \frac{du}{dy} + 4f^3(u) \cdot \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dy}$
 $= x^2 \frac{dg}{du} \cdot 3y^2 + 4f^3(u) \cdot \frac{df}{du} \cdot 3y^2$

Ejemplo 4.8

Recordemos que en una variable, si $a > 0$ y f y g son derivables, entonces aplicando regla de la cadena,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} (a^{g(u)}) = a^{g(u)} \cdot \ln a \cdot \frac{dg}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} ([f(x)]^\alpha) = \alpha \cdot f(x)^{\alpha-1} \cdot \frac{df}{dx} \end{array} \right.$$

Si $z = (\sin x)^{y^2}$, calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución:

- $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} ((\sin x)^{y^2}) = y^2 \cdot [\sin x]^{y^2-1} \cdot \frac{d}{dx} (\sin x) = y^2 \cdot [\sin x]^{y^2-1} \cdot \cos x$
- $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} ((\sin x)^{y^2}) = [\sin x]^{y^2} \cdot \ln(\sin x) \cdot \frac{d}{dy} (y^2) = [\sin x]^{y^2} \cdot \ln(\sin x) \cdot 2y$

4.10 Ejercicios

(R) 4.10.1 Sea $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 - y^2}$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $f_y(2, 1)$.

(R) 4.10.2 Sea $f(x, y) = \ln^5(x^y + x^2 + 2^y)$ Calcule $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$.

(R) 4.10.3 Sea $z = f\left(\frac{x^2}{y}\right)$ con f derivable. Verifique que $x\frac{\partial z}{\partial x} + 2y\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

(R) 4.10.4 Sea $z = \sqrt{xy + \arctan\left(\frac{y}{x}\right)}$. Demuestre que $zx\frac{\partial z}{\partial x} + zy\frac{\partial z}{\partial y} = xy$.

(R) 4.10.5 Sea $z = f(x^2y + y) \cdot \sqrt{x + y^2}$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$.

(R) 4.10.6 Sea f una función derivable en todo \mathbb{R} y sea $w(x, y) = f(y \operatorname{sen} x)$ si $u = y \operatorname{sen} x$, verifique que

$$\cos(x)\frac{\partial w}{\partial x} + y \operatorname{sen}(x)\frac{\partial w}{\partial y} = yf'(u)$$

(R) 4.10.7 Sea $z = g^3(x^2)f(y^2) + \tan x^2$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial y}$

(R) 4.10.8 La resistencia total R producida por tres conductores con resistencias R_1 , R_2 y R_3 conectadas en paralelo en un circuito eléctrico está dado por la fórmula $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$. Calcule $\frac{\partial R}{\partial R_1}$. Sugerencia: $R = R(R_1, R_2, R_3)$. Derive a ambos lados respecto a R_1 .

(R) 4.10.9 La ley de gases para un gas ideal de masa fija m , temperatura absoluta T , presión P y volumen V es $PV = mRT$ donde R es la constante universal de los gases ideales. Verifique que $\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$.

4.11 Solución de los ejercicios

4.10.1 

Usando la regla para la derivada del cociente,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\frac{\partial}{\partial y}[xy] \cdot (x^2 - y^2) - \frac{\partial}{\partial y}[x^2 - y^2] \cdot xy}{(x^2 - y^2)^2} \\ &= \frac{x \cdot (x^2 - y^2) + 2y \cdot xy}{(x^2 - y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\frac{\partial}{\partial x} [xy] \cdot (x^2 - y^2) - \frac{\partial}{\partial x} [x^2 - y^2] \cdot xy}{(x^2 - y^2)^2} \\ &= \frac{y \cdot (x^2 - y^2) - 2x \cdot xy}{(x^2 - y^2)^2}\end{aligned}$$

$$f_y(2, 1) = \frac{10}{9}.$$

4.10.2  Se debe usar la regla de la cadena para funciones de una variable,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= 5 \ln^4(x^y + x^2 + 2^y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} [\ln(x^y + x^2 + 2^y)] \\ &= 5 \ln^4(x^y + x^2 + 2^y) \cdot \frac{1}{x^y + x^2 + 2^y} \cdot (x^y \ln x + 2^y \ln 2) \\ &= \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= 5 \ln^4(x^y + x^2 + 2^y) \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\ln(x^y + x^2 + 2^y)] \\ &= 5 \ln^4(x^y + x^2 + 2^y) \cdot \frac{1}{x^y + x^2 + 2^y} \cdot (y \cdot x^{y-1} + 2x)\end{aligned}$$

4.10.3  Sea $u = \frac{x^2}{y}$, entonces $z = f(u)$

- $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{2x}{y}$
- $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot \frac{-x^2}{y^2}$
- $x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \left[\frac{2x^2}{y} - \frac{2x^2}{y} \right] = 0 \quad \checkmark$

4.10.4 

- $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y - \frac{y}{x^2 + y^2}}{2z}$
- $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x + \frac{x}{x^2 + y^2}}{2z}$
- Ahora sustituimos,

$$\begin{aligned}zx \frac{\partial z}{\partial x} + zy \frac{\partial z}{\partial y} &= zx \frac{y - \frac{y}{x^2 + y^2}}{2z} + zy \frac{x + \frac{x}{x^2 + y^2}}{2z} \\ &= \frac{2xy - \frac{xy}{x^2 + y^2} + \frac{xy}{x^2 + y^2}}{2} = xy\end{aligned}$$

4.10.5 

z es una función de dos variables pero f es una función de un solo argumento y como tal, se deriva de la manera ordinaria. Aquí es conveniente hacer el cambio de variable $u = x^2 + y$ de tal manera que $z = f(u) \cdot \sqrt{x + y^2}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) \cdot \frac{\partial}{\partial y} [u] \cdot \sqrt{x + y^2} + f(u) \cdot \frac{\partial}{\partial y} [\sqrt{x + y^2}] \\ &= f'(u) \cdot (x^2 + 1) \cdot \sqrt{x + y^2} + f(u) \cdot \frac{y}{\sqrt{x + y^2}} \\ &= \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \cdot \frac{\partial}{\partial x} [u] \cdot \sqrt{x + y^2} + f(u) \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\sqrt{x + y^2}] \\ &= f'(u) \cdot (2xy) \cdot \sqrt{x + y^2} + f(u) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x + y^2}}\end{aligned}$$

4.10.6 

Sea $u = y \operatorname{sen}(x)$, entonces $w = f(u)$.

- $w_x = f'(u) \cdot y \cos(x)$
- $w_y = f'(u) \cdot \operatorname{sen}(x)$
- $\cos(x)w_x + y \operatorname{sen}(x)w_y = \cos^2(x) \cdot y \cdot f'(u) + \operatorname{sen}^2(x) \cdot y \cdot f'(u) = (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) y f'(u) = y f'(u)$

4.10.7 

$$z = g^3(u)f(v) + \tan(x^2) \text{ con } u = x^2 \text{ y } v = y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3g^2(u)g'(u) \cdot 2x \cdot f(v) + g^3(u) \cdot f'(v) \cdot 0 + ? \frac{2x}{1+x^4}$$

4.10.8 

Derivamos a ambos lados respecto a R_1 ,

$$\frac{\partial}{\partial R_1} \left[\frac{1}{R} \right] = \frac{\partial}{\partial R_1} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right]$$

$$\frac{-1 \cdot \frac{\partial R}{\partial R_1}}{R^2} = \frac{-1}{R_1^2} \implies \frac{\partial R}{\partial R_1} = \frac{R^2}{R_1^2}.$$

4.10.9 

- $\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{P}{V}$
- $\frac{\partial V}{\partial T} = \frac{mR}{P}$
- $\frac{\partial T}{\partial P} = \frac{V}{mR}$
- $\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -\frac{P}{V} \frac{mR}{P} \frac{V}{mR} = -1. \checkmark$



Este material se distribuye bajo licencia Creative Commons "Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional" (CC BY-NC-ND 4.0) (ver; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>)

Citar como:

Walter Mora F. *Cálculo en Varias Variables. Visualización interactiva.* (2019) 2da ed. [ebook] Cartago, Costa Rica. Revista digital, Matemática, Educación e Internet. https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/revistamatematica/material_didactico/libros/.



Revisado: Julio, 2022

Versión actualizada (correcciones, nuevos ejemplos y ejercicios) de este libro y las aplicaciones CDF: https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/revistamatematica/material_didactico/libros/

<http://www.matematicainteractivacr.com/>